Expertise humaine et logique floue

Nathalie Perrot
Dr INRA, UMR GMPA
Équipe MALICES

Hypothèses : l'expertise existe et l'expert est la référence

• Difficultés potentielles

- Accès à la ligne de production
- Choix des opérateurs
- Disponibilité des opérateurs
- Validation en conditions réelles
- Recueil d'expertise : phase-clé $\Rightarrow$ convaincre !

• Facteurs de réussite

- Importance de la relation interviewé/opérateur
- Écoute, relation de confiance, enthousiasme
- Expliquer, informer, montrer l'avancement
- Personne externe à l'entreprise
- Fiabilité des mesures
- Importance de l'interface $\Rightarrow$ déclic !

Supposons un système défini par son état de protéolyse en fonction de sa couleur et sa masse

Comment représenter ce système????

$$ETAT\ PROT = f(MASSE, COULEUR)$$

MAIS...Pas toujours possible

Base de données

RN

$$P(X_1, X_2, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i | pa(X_i))$$

Node	Parents	Probabilities	Node	Parents	Probabilities
A		$P(A=a_1) = 0.99$ $P(A=a_2) = 0.01$	C	B	$P(C=c_1 B=b_1) = 0.3$ $P(C=c_2 B=b_1) = 0.7$ $P(C=c_1 B=b_2) = 0.5$ $P(C=c_2 B=b_2) = 0.5$
B	A, E	$P(B=b_1 A=a_1, E=e_1) = 0.5$ $P(B=b_2 A=a_1, E=e_1) = 0.5$ $P(B=b_1 A=a_1, E=e_2) = 0.1$ $P(B=b_2 A=a_1, E=e_2) = 0.9$ $P(B=b_1 A=a_2, E=e_1) = 0.4$ $P(B=b_2 A=a_2, E=e_1) = 0.6$ $P(B=b_1 A=a_2, E=e_2) = 0.2$ $P(B=b_2 A=a_2, E=e_2) = 0.8$	D	A	$P(D=d_1 A=a_1) = 0.8$ $P(D=d_2 A=a_1) = 0.2$ $P(D=d_1 A=a_2) = 0.7$ $P(D=d_2 A=a_2) = 0.3$
			E		$P(E=e_1) = 0.75$ $P(E=e_2) = 0.25$

RB

Base d'expérience

R1 : Si la couleur est *Ivoire* et la masse est *moyen*
ALORS le fromage est *peu protéolysé*.

R2 : Si la couleur est *jaune* et la masse est *moyen*
ALORS le fromage est *moyennement protéolysé*.

R3 : Si la couleur est *ivoire* et la masse est *faible*
ALORS le fromage est *peu protéolysé*.

Comment la traiter??

IDEE Construire l'algorithme

Mesure, mesure indirecte ou aide à la décision

Les systèmes experts

« *Un système expert est un programme informatique simulant l'intelligence humaine dans un champ particulier de la connaissance ou relativement à une problématique déterminée.* »

3 composants essentiels :

- Une base de connaissance
- Un ensemble de règles de décision
- Un moteur d'inférence

La logique floue

Théorie des ensembles flous

Théorie des possibilités

Logique floue - Historique

Origine : formalisation de l'incertain (Pascal et Bernouilli 17ème)

- Incertain objectif : jeux de hasard
- Incertain subjectif : fiabilité des évidences

1965 : Théorie de L. Zadeh

- Association à une connaissance d'un ensemble flou

1975-98 : Application de ce concept au contrôle et démonstrations grand public

- Mamdani, Takagi et Sugeno

Logique floue - Quelques applications en alimentaire

AUTEURS	MESURE	MODELISATION	CONTROLE	
[Davidson 99]		✓	✓	cuisson four batch
[Eerikainen 88]			✓	extrusion
[Khodja 96]	✓			arômes café
[Linko 92]			✓	extrusion
[Ruger 95]			✓	séchage
[Simutis 93]		✓		biotechnologie
[Sun 93]	✓			arôme cacahuètes
[Yea 94]	✓			odeurs
[Zhang 92 93]		✓	✓	séchage

Logique floue - Objectifs

Prendre en compte à l'aide d'outils mathématiques la connaissance et la représentation mentale d'un individu afin de modéliser un système, son contrôle ou des informations pertinentes le concernant

Deux axes :

- Ensembles flous
- Raisonnement flou

2 Théorie des ensembles flous

Logique floue - Théorie (1ère approche)

Logique Booléenne
Inclusion ou exclusion totale

"A=set of speed upper than 90 km/h"

$A = \{v / \chi_A(v) = 1\}$ $\chi_A =$ characteristic function

Logique floue
Transitions graduelles

"A=set of the high speed"

$A = \{v / \mu_A(v) \neq 0\}$ $\mu_A =$ membership function

3 méthodes basiques pour définir un ensemble:

Soit un ensemble A et des éléments de cet ensemble a_1 à a_n

$$A = \{a_1, \dots, a_n\};$$

$$A = \{x/P(x)\} \quad P(x) \text{ « } x \text{ a les propriétés } P \text{ »}$$

Pour tout $x \in X$, $P=0$ ou 1 ;

Fonction caractéristique $\chi_A(x) = 1$ si $x \in A$; 0 sinon; Mapping des éléments de X sur un ensemble $\{0, 1\}$:

$$\chi_A: X \rightarrow \{0, 1\}$$

Quelques notations et propriétés:

1 A inclus $\subset = B$: dans ce cas A est un sous ensemble de B

2 $A \neq B$: A ne contient pas les mêmes éléments que B

1+2 : $A \subset B$ mais au moins 1 élément de B qui n'est pas dans A : $A \subset B$, A est un sous ensemble strict

$B - A = \{x / x \in B \text{ AND } x \notin A\}$

$B \cup A = \{x / x \in B \text{ OR } x \in A\}$

Représentez sur feuille

$A \cap B = \{x / x \in A \text{ AND } x \in B\}$

TABLE 1.1 FUNDAMENTAL PROPERTIES OF CRISP SET OPERATIONS

Involution	$\overline{\overline{A}} = A$
Commutativity	$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$
Associativity	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Distributivity	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
Idempotence	$A \cup A = A$ $A \cap A = A$
Absorption	$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$
Absorption by X and $\emptyset$	$A \cup X = X$ $A \cap \emptyset = \emptyset$
Identity	$A \cup \emptyset = A$ $A \cap X = A$
Law of contradiction	$A \cap \overline{A} = \emptyset$
Law of excluded middle	$A \cup \overline{A} = X$
De Morgan's laws	$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

Quelques notations et propriétés:

Ensembles convexes?

Définition convexité?

Logique floue - Théorie (ensembles flous)

U=variable; E=ensemble

$$E = \{(u, \mu_E(u)) \mid u \in U\}$$

$$\mu_E : U \rightarrow [0,1]$$

Definitions

Support : Elements de U qui appartiennent au sous ensemble A de E avec un degré supérieur à 0

$$\text{supp}(A) = \{x \in U / f_A(x) \neq 0\}$$

Hauteur : la plus haute valeur prise par la fonction d'appartenance

$$h(A) = \sup_{x \in U} f_A(x)$$

Noyau : l'ensemble des éléments qui appartiennent à A avec un degré 1

$$\text{noy}(A) = \{x \in U / f_A(x) = 1\}$$

Représentez sur feuille

Exemples

$$\text{supp}(A) =]3.5;6.5[$$

$$h(A) = 1$$

$$\text{noy}(A) = [4.5;6]$$

4 fonctions floues courantes:

r est le nombre réel pour lequel le degré d'appartenance est égal à 1

$$A1(x) = \begin{cases} p1(x - r) + 1 & \text{when } x \in [r - \frac{1}{p1}, r] \\ p1(r - x) + 1 & \text{when } x \in [r, r + \frac{1}{p1}] \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Tracez sur Matlab
binômes

$$A2(x) = \frac{1}{1 + p2(x - r)^2}$$

$$A3(x) = e^{-|p3(x-r)|}$$

$$A4(x) = \begin{cases} \frac{1 + \cos(p4\pi(x - r))}{2} & \text{when } x \in [r - \frac{1}{p4}, r + \frac{1}{p4}] \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Figure 1.2 Examples of membership functions that may be used in different contexts for characterizing fuzzy sets of real numbers close to 2.

Logique floue - Théorie (ensembles flous)

⇒ Différentes distributions

⇒ Variable linguistique

Exemple de fonctions floues:

3 ensembles flous définissant le concept d'âge définies sur

$$A1(x) = \begin{cases} 1 & \text{when } x \leq 20 \\ \frac{(35 - x)}{15} & \text{when } 20 < x < 35 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$A2(x) = \begin{cases} 0 & \text{when either } x \leq 20 \text{ or } \geq 60 \\ \frac{x - 20}{15} & \text{when } 20 < x < 35 \\ \frac{60 - x}{15} & \text{when } 45 < x < 60 \\ 1 & \text{when } 35 \leq x \leq 45 \end{cases}$$

$$A3(x) = \begin{cases} 0 & \text{when } x \leq 45 \\ \frac{x - 45}{15} & \text{when } 45 < x < 60 \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Le concept d' α coupe et strict α coupe est important pour tout ensemble flou défini sur X et tout nombre entre $[0,1]$:

$$\alpha A = \{x/A(x) \geq \alpha\}$$

$$\alpha +A = \{x/A(x) > \alpha\}$$

Calculez $\alpha A1$, $\alpha A2$, $\alpha A3$ par exemple

From Ordinary (Crisp) ...

Figure 1.10 Normal fuzzy set that is not convex.

is

Logique floue - Théorie (ensembles flous)

⇒ Intersection entre ensembles flous

$$i: [0,1] \times [0,1] \rightarrow [0,1]$$

$$(A \cap B)(x) = \min[A(x), B(x)]$$

$$(A \cup B)(x) = \max[A(x), B(x)]$$

Tnorm « AND »

Tconorm « OR »

Autres T-norm

Zadeh t-norm

$$T(x,y)=\min(x,y)$$

Probabilist t-norm

$$T(x,y)=xy$$

Lukasiewicz t-norm

$$T(x,y)=\max(x+y-1,0)$$

Autres T-conorms

Zadeh T-conorm

$$T_c(x,y)=\max(x,y)$$

Probabilist T-conorm

$$T_c(x,y)=x+y-xy$$

Lukasiewicz T-conorm

$$T(x,y)=\min(x+y,1)$$

Tracez les différentes fonctions en générant un maillage de 0 à 1 (binômes)

Fuzzy meanings (FM) and descriptions (FD)

FM correspond à trouver le sous ensemble des nombres et incertitudes associées qui représentent le symbole (ex : chaud [20,27])

Fuzzy Meaning (FM) :

$$X1 = [0,30]$$

Temperature of a lake

$$\mu_{Mx1(\text{chaud})}(X)$$

$$X2 = [4000,6000]$$

Temperature of steel flow

$$\mu_{Mx2(\text{chaud})}(X)$$

Fuzzy meanings (FM) and descriptions (FD)

FD d'un nombre c est trouver l'ensemble des sous ensembles linguistiques associés à ce nombre (ex : 22°C $0.2/W + 0.8/H$)

Fuzzy Description (DF) :

$$D_{L(x)} : X \rightarrow F(L(X))$$

$$x \rightarrow D_{L(x)}(X)$$

L {Very cold, cold, warm, hot, very hot} $(X)=[0,30]$

$\mu_{FD_{(5)}}(L)?$ $\mu_{FD_{(22)}}(L)?$

Linguistic modifiers

Renforcement « vraiment », « très ».

Affaiblissement « moins », « relatif »

Soit f_A la fonction d'appartenance de A et m un modifieur linguistique, la nelle fonction d'appartenance $m(A)$ est $f_{m(A)}$.

$$f_{m(A)} = tm (f_A)$$

tm mathematical function associated to m

Example :

$$m=\text{very} \quad \text{so} \quad f_{m(A)} = tm (f_A (x)) = (f_A (x))^2$$

Travail sur l'algorithme de calcul associé aux ensembles flous...cf. « interface 1 test croûtage ».m
Construire fuzzy4triangle

Logique floue - Théorie (ensembles flous)

⇒ Trois intérêts principaux des ensembles flous

- Structuration des connaissances confère une tolérance à l'imprécision.
- Transitions graduelles entre ensembles confèrent une robustesse de l'approche.
- Information proche de celle manipulée par les opérateurs

Logique floue - Théorie (raisonnement flou)

Implications floues et modus ponens generalisé

Supposons une relation entrée/sortie entre des variables d 'un procédé. La connaissance sur ces relations peut être explicitée sous forme de règles linguistiques floues

« *SI la température de la piece est élevée ALORS le confort est mauvais* »

Si V (associé à X) est A ALORS W (associé à Y) est B

Les règles floues mises en œuvre au travers d 'un raisonnement flou représentent un lien symbolique entre des entrées/sorties d 'un système

Opérateurs logiques

R1 : **Si la couleur est *Ivoire* et la masse est *moyen*** ALORS le fromage est *peu protéolysé*.

R2 : **Si la couleur est *jaune* et la masse est *moyen*** ALORS le fromage est *moyennement protéolysé*.

R1 : **Si la couleur est *Ivoire* et la masse est *moyen*** ALORS le fromage est *peu protéolysé*.

R3 : **Si la couleur est *ivoire* et la masse est *faible*** ALORS le fromage est *peu protéolysé*.

R3 : Si la couleur est *ivoire* et la masse est *faible* ALORS le fromage est *peu protéolysé*.

« *SI la température de la pièce est élevée ALORS le confort est mauvais* »

Si V (associé à X) est A ALORS W (associé à Y) est B

On définit une **implication floue** définie à partir de X et Y .

La valeur de vérité de la proposition floue est définie par la fonction d'appartenance f_R d'une relation floue R entre X et Y

Fuzzy implications

Main fuzzy implications

$$f_{R-R}(x, y) = 1 - f_A(x) + f_A(x)f_B(y) \quad \text{Reichenbach}$$

$$f_{R-L}(x, y) = \min(1 - f_A(x) + f_B(y), 1) \quad \text{Lukasiewicz}$$

$$f_{R-M}(x, y) = \min(f_A(x), f_B(y)) \quad \text{Mamdani}$$

$$f_{R-P}(x, y) = f_A(x) \cdot f_B(y) \quad \text{Larsen}$$

Example

$$\forall y \in Y, f_B(y) = 1$$

$$\text{Si } x \in [1, 2], f_A(x) = -x + 2$$

Implication of Mamdani

$$f_R(x, y) = \min(f_A(x), f_B(y))$$

$$f_R(x, y) = \min(-x + 2, 1)$$

$$f_R(x, y) = -x + 2 \quad \forall y \text{ and } x \in [1, 2]$$

Table de vérité

Valeur de vérité		Nom
$f_{RR}(x,y)$	$1 - f_A(x) + f_A(x) \cdot f_B(y)$	Reichenbach
$f_{RW}(x,y)$	$\max(1 - f_A(x), \min(f_A(x), f_B(y)))$	Willmott
$f_{RRG}(x,y)$	$\begin{cases} 1 & \text{si } f_A(x) \leq f_B(y) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$	Rescher-Gaines
$f_{RKD}(x,y)$	$\max(1 - f_A(x), f_B(y))$	Kleene-Dienes
$f_{RBG}(x,y)$	$\begin{cases} 1 & \text{si } f_A(x) \leq f_B(y) \\ f_B(y) & \text{sinon} \end{cases}$	Brouwer-Gödel
$f_{RG}(x,y)$	$\begin{cases} \min(f_B(y)/f_A(x), 1) & \text{si } f_A(x) \neq 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$	Goguen
$f_{RL}(x,y)$	$\min(1 - f_A(x) + f_B(y), 1)$	Lukasiewicz
$f_{RM}(x,y) *$	$\min(f_A(x), f_B(y))$	Mamdani
$f_{RP}(x,y) *$	$f_A(x) \cdot f_B(y)$	Larsen

x \ y	$[0, c[$	$]c, d[$	$[d, \infty[$	$f_A(x)$
$[0, a[$				0
$]a, b[$				$(x-a)/(b-a)$
$]b, \infty[$				1
$f_B(y)$	0	$(x-c)/(d-c)$	1	

Quels résultats?

Règle floue concernant un diamant:

Si le poids est important, alors le prix est élevé.

le poids est important

le prix est élevé

Table de vérité

Valeur de vérité		Nom
$f_{RR}(x,y)$	$1 - f_A(x) + f_A(x) \cdot f_B(y)$	Reichenbach
$f_{RW}(x,y)$	$\max(1 - f_A(x), \min(f_A(x), f_B(y)))$	Willmott
$f_{RRG}(x,y)$	$\begin{cases} 1 & \text{si } f_A(x) \leq f_B(y) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$	Rescher-Gaines
$f_{RKD}(x,y)$	$\max(1 - f_A(x), f_B(y))$	Kleene-Dienes
$f_{RBG}(x,y)$	$\begin{cases} 1 & \text{si } f_A(x) \leq f_B(y) \\ f_B(y) & \text{sinon} \end{cases}$	Brouwer-Gödel
$f_{RG}(x,y)$	$\begin{cases} \min(f_B(y)/f_A(x), 1) & \text{si } f_A(x) \neq 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$	Goguen
$f_{RL}(x,y)$	$\min(1 - f_A(x) + f_B(y), 1)$	Lukasiewicz
$f_{RM}(x,y) *$	$\min(f_A(x), f_B(y))$	Mamdani
$f_{RP}(x,y) *$	$f_A(x) \cdot f_B(y)$	Larsen

x \ y	$]0, c[$	$]c, d[$	$]d, \infty[$	$f_A(x)$
$]0, a[$	1	1	1	0
$]a, b[$	$(b-x)/(b-a)$	$\min(1 - (x-a)/(b-a) + (y-c)/(d-c), 1)$	1	$(x-a)/(b-a)$
$]b, \infty[$	0	$(x-c)/(d-c)$	1	1
$f_B(y)$	0	$(x-c)/(d-c)$	1	

DEFUZZIFICATION:

CENTROID DEFUZZIFICATION
USING MAX-MIN INFERENCE

« *SI la température de la pièce est élevée ALORS le confort est mauvais* »

Si V (associé à X) est A ALORS W (associé à Y) est B
 f_A et f_B les fonctions d'appartenances

On parle du **modus ponens généralisé** moyennant certaines propriétés quand:

<<Un nouveau fait est observé ie

V est A' avec $f_{A'}$ pour fonction d'appartenance.

<<Conclusion W est B' avec $f_{B'}$

Fuzzy implications les plus utilisées: Mamdani ou Takagi Sugeno à sortie constante

$A \rightarrow B$ // Si A' , B' ?

⇒ Modus ponens pour tout x de A et y de B

Pour tout A' : $\forall y \in Y f_{B'}(y)$
 $= \sup_{x \in X} T(f_{A'}(x), f_R(x, y))$

$\mu_{A \times B}(x, y) = \min(f_A(x), f_B(y))$ **Mamdani**

$$\mu_{B'}(y) = \max_x [\min(\mu_{A'}(x), \mu_{A \times B}(x, y))] = \max_x [\min(\mu_{A'}(x), \mu_A(x), \mu_B(y))]$$
$$\Leftrightarrow \mu_{B'}(y) = \min[\mu_B(y), \max_x (\min(\mu_{A'}(x), \mu_A(x)))] \quad (1.5)$$

➡ !!Les règles sont la plupart du temps toutes actives en même temps

Mamdani ou Takagi Sugeno à sortie constante: vision ingénieur en conduite de procédés

Logique floue - Théorie (raisonnement flou)

⇒ Composition entre les symboles/ agrégation :

max 'pour le OU' / min 'pour le ET' ou
somme bornée 'pour le OU' / produit 'pour le ET'

R1 : Si la couleur est *Ivoire* et la masse est *moyen*
ALORS le fromage est *peu protéolysé*.

R2 : Si la couleur est *jaune* et la masse est *moyen*
ALORS le fromage est *moyennement protéolysé*.

R3 : Si la couleur est *ivoire* et la masse est *faible*
ALORS le fromage est *peu protéolysé*.

1/Ivoire

R1 : Si la couleur est *Ivoire* et la masse est *moyen*
 ALORS le fromage est *peu protéolysé*.
 R2 : Si la couleur est *jaune* et la masse est *moyen*
 ALORS le fromage est *moyennement protéolysé*.
 R3 : Si la couleur est *ivoire* et la masse est *faible*
 ALORS le fromage est *peu protéolysé*.

??

300 g 0/faible+1/moyen+0/élevée

μ_{R1} degré d'activation de la prémisse R1: $\mu(Ivoire) * \mu(moyen) = 1 * 1 = 1$

μ_{R2} et $\mu_{R3}???$

Exemple :

Couleur
1/Ivoire

Degré de protéolyse d'un fromage
??

Balance

Masse
300 g 0/faible+1/moyen+0/élevée

R1 : Si la couleur est *Ivoire* et la masse est *moyen*
alors le fromage est *peu protéolysé*.
R2 : Si la couleur est *jaune* et la masse est *moyen*
alors le fromage est *moyennement protéolysé*.
R3 : Si la couleur est *ivoire* et la masse est *faible*
alors le fromage est *peu protéolysé*.

Règle R1 **1/Peu protéolysé**

Exemple :

Couleur

0,6/Ivoire +
0,4/Jaune

Degré de protéolyse d'un fromage

R1 : Si la couleur est *Ivoire* et la masse est *moyen* alors le fromage est *peu protéolysé*.

R2 : Si la couleur est *jaune* et la masse est *moyen* alors le fromage est *moyennement protéolysé*.

R3 : Si la couleur est *ivoire* et la masse est *faible* alors le fromage est *peu protéolysé*.

Balance

Masse

120 g 0,8/faible+0,2/moyen+0/élevée

$$\mu_{R1} = \mu(\text{ivoire})_{\text{Couleur}} * \mu(\text{moyen})_{\text{masse}} = 0,6 * 0,2 = 0,12$$

$$\mu_{R2} = \mu(\text{jaune})_{\text{Couleur}} * \mu(\text{moyen})_{\text{masse}} = 0,4 * 0,2 = 0,08$$

$$\mu_{R3} = \mu(\text{ivoire})_{\text{Couleur}} * \mu(\text{faible})_{\text{masse}} = 0,6 * 0,8 = 0,48$$

Comment aller vers le degré de protéolyse??

Modus ponens généralisés

Exemple :

Couleur

0,6/Ivoire +
0,4/Jaune

R1 : Si la couleur est *Ivoire* et la masse est *moyen*
alors le fromage est *peu protéolysé*.
R2 : Si la couleur est *jaune* et la masse est *moyen*
alors le fromage est *moyennement protéolysé*.
R3 : Si la couleur est *ivoire* et la masse est *faible*
alors le fromage est *peu protéolysé*.

Degré de protéolyse d'un fromage

Balance

Masse

120 g 0,8/faible+0,2/moyen+0/élevée

$$\mu_{R1} = \mu(\text{ivoire})_{\text{Couleur}} * \mu(\text{moyen})_{\text{masse}} = 0,6 * 0,2 = 0,12$$

$$\mu_{R2} = \mu(\text{jaune})_{\text{Couleur}} * \mu(\text{moyen})_{\text{masse}} = 0,4 * 0,2 = 0,08$$

$$\mu_{R3} = \mu(\text{ivoire})_{\text{Couleur}} * \mu(\text{faible})_{\text{masse}} = 0,6 * 0,8 = 0,48$$

Modus ponens et activation simultanée des règles par OU:

$$\mu(\text{peu protéolysé}) = \mu_{R1} + \mu_{R3} = 0,12 + 0,48 = 0,60$$

$$\mu(\text{moyennement protéolysé}) = \mu_{R2} = 0,08$$

0,60/Peu protéolysé + 0,08/Moyennement protéolysé

Defuzzyfication :

Transformation d'un ensemble flou F en une sortie numérique

Méthode des maximas ou centre de gravité

Méthode des hauteurs

Valeur modale

$$y_d = \frac{\sum_{j \in J} y_j \times \mu_j}{\sum_{j \in J} \mu_j}$$

Pour notre application: 0,60/Peu protéolysé (VM =1) + 0,08/Moyennement protéolysé (VM=2)

$$Y_d = (0,60 * 1 + 0,08 * 2) / 0,68 = 1.11$$

IDEE Valider

Mesure, mesure indirecte ou aide à la décision

Validation quantitative sur bases de données

Sur données numériques :

$$C = \sum_{i=1,2,3}^n d$$

$$d = 1 \quad \text{si} \quad Di \leq St \quad \text{avec} \quad Di = |Rm - Ro|$$

$$d = 0 \quad \text{si} \quad Di > St$$

Rm = réponse modèle

Ro = réponse expert

Sur données linguistiques :

$$E = \sum_{i=1,2,\dots} |(\mu_{ATi} - \mu_{BTi})| / n$$

A : 0,2/petit + 0,8/moyen + 0/grand + 0/immense

B : 0/petit + 0,6/moyen + 0,4/grand + 0/immense

$$E = (|(0,2 - 0)| + |(0,8 - 0,6)| + |(0 - 0,4)|) / 3$$

$$E = (0,2 + 0,2 + 0,4) / 3 = 0,28$$

Construisez un modèle sur le croutage